

Hybride Ringsnavelmeeuw x Stormmeeuw in het Zandvoortweggebied

Op 24 april 2008 ontdekte Pim Wolf een derdekalenderjaar hybride Ringsnavelmeeuw x Stormmeeuw in het Zandvoortweggebied. De vogel foerageerde vaak in een gemengde groep Stormmeeuwen,



Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen achter een trekker in de akker op de hoek Schotelweg/Zandvoortweg. Regelmatig rustte en poetste de vogel zich uitgebreid in de meest westelijke plasjes langs de Zandvoortweg. De vogel liet zich hier tot in de avond behoorlijk goed bekijken. Na de 24ste werd het steeds lastiger om de vogel te kunnen vinden omdat hij toen ook naar andere akkers vloog om te fourageren en een veel groter gebied bestreek. De laatste keer dat hij gezien werd was op 27 april.

Hoewel de determinatie van hybride meeuwen erg lastig kan zijn liet deze vogel toch wel duidelijk kenmerken zien van zowel Ringsnavelmeeuw als van Stormmeeuw. Enkele opvallende kenmerken die Pim en ik in het veld noteerde en op de foto's te zien zijn;

1. De vogel was iets groter en steviger gebouwd dan een Stormmeeuw, met een iets dikker nek, een grotere en meer ronde kop en een langere handpenprojectie. De mantelkleur was lichter dan de omringende Stormmeeuwen en zelfs lichter dan die van een Zilvermeeuw waarmee we direct in het veld konden vergelijken.
2. De vorm van de snavel zat tussen Ringsnavelmeeuw en Stormmeeuw in, hij was slanker, iets korter, oogde wat minder krachtig met een iets stompere punt dan Ringsnavelmeeuw. De zwarte subterminale snavelband paste totaal niet op Stormmeeuw, maar op internet kwamen we foto's tegen van Ringsnavelmeeuwen met een vrijwel identieke snavelband.
3. De donkere iris is één van de doorslaggevend kenmerken om deze vogel een hybride te noemen. Sommige Ringsnavelmeeuwen hebben de eerste paar maanden van hun derde kalenderjaar ook nog een redelijk donker lijkende iris, maar altijd is er wel iets van een lichte geelgroenige iris te zien en zeker vanaf eind april moet derdekalenderjaar Ringsnavelmeeuw een duidelijk zichtbare lichtere iris hebben.
4. De donkere tekening op de staartpennen is een goed kenmerk voor Ringsnavelmeeuw, dit is overigens een vrij variabel kenmerk, sommige Ringsnavelmeeuwen tonen veel zwart en andere juist weinig zwarte tekening op de staartpennen.


5. De mirror op p10 is vrij groot, redelijk ver van de top van de handpen af en de vorm is niet goed voor Ringsnavelmeeuw. De meeste derdekalenderjaar Ringsnavelmeeuw laten een kleine ronde mirror zien op de binnenvlag van p10. Derdekalenderjaar Stormmeeuwen hebben vrij grote en langgerekte mirror op p10 en een kleine mooi ronde mirror op p9. Vooral de grootte en de vorm van de mirror op p10 bij 'onze' vogel wijkt dus sterk af het patroon dat de meeste Ringsnavelmeeuwen tonen.



Het betreft hier waarschijnlijk het tweede geval binnen de Western Palearctic, begin 2008 was er een eerder geval van een gekleurringde vogel in Noord-Ierland. Tijdens het zoeken naar vergelijkingsmateriaal op internet kwamen we foto's tegen van een geringde vogel bij Bergen (Noorwegen) die er als eerste-winter goed uitzag voor een zuivere Ringsnavelmeeuw maar als tweede-winter en adult toch wat kenmerken toonde die op een hybride wezen en het is dus goed mogelijk dat er nog meer gevallen zijn die nooit goed gedocumenteerd of gepubliceerd zijn. Maar het is duidelijk dat gevallen van hybride Ringsnavelmeeuw x Stormmeeuw erg zeldzaam zijn!

6. De subterminale band die over p4 loopt is erg breed en niet onderbroken. Sommige derdekalenderjaar Ringsnavelmeeuwen tonen ook een subterminale band op p4, maar altijd is deze band dan erg dun en vaak ook onderbroken. Derdekalenderjaar Stormmeeuwen laten vaak een subterminale band zien op p4 en soms zelfs zwarte tekening op p3.

Onderstaand figuur toont een schets van de linkervleugel van 'onze' vogel.



Tekst, foto's en schets
les Meulmeester